

PAP TEST O TEST DI PAPANICOLAU

Il **Pap test** è un esame di screening citologico rapido e indolore utilizzato per individuare le alterazioni delle cellule del collo dell'utero.

HPV – DNA HPV O PAPILLOMA VIRUS

Il test **DNA – HPV** è un esame molecolare che ha lo scopo di identificare la presenza di tali ceppi ad alto rischio oncogeno in un campione di mucosa della cervice. Il test consiste nel prelievo di una piccola quantità di cellule dal collo dell'utero (o cervice uterina) che vengono successivamente analizzate per verificare la presenza del DNA del virus.

PREPARAZIONE

L'esame **non deve essere effettuato durante le mestruazioni**: è consigliato eseguirlo

dal 10° al 22° giorno del ciclo (contando dal primo giorno delle mestruazioni) e in ogni caso **non devono esserci perdite ematiche in atto**.

Se dovessero sopraggiungere deve essere rimandato.

Si dovrebbero inoltre **evitare i rapporti sessuali nelle 48 ore precedenti alla raccolta del campione**.

È sconsigliato l'uso di lavande vaginali o l'inserimento di ovuli, prodotti spermicidi, creme, gel o schiume di qualunque tipo in vagina **nelle 72 ore precedenti all'esame**.

L'uso di contraccettivi orali o locali o la presenza della spirale intrauterina, invece, non interferiscono con il risultato del test.

L'esame può essere eseguito anche in gravidanza

Il referto disponibile entro 25 gg (lavorativi)

PAP TEST O TEST DI PAPANICOLAU

Il **Pap test** è un esame di screening citologico rapido e indolore utilizzato per individuare le alterazioni delle cellule del collo dell'utero.

HPV – DNA HPV O PAPILLOMA VIRUS

Il test **DNA – HPV** è un esame molecolare che ha lo scopo di identificare la presenza di tali ceppi ad alto rischio oncogeno in un campione di mucosa della cervice. Il test consiste nel prelievo di una piccola quantità di cellule dal collo dell'utero (o cervice uterina) che vengono successivamente analizzate per verificare la presenza del DNA del virus.

PREPARAZIONE

L'esame **non deve essere effettuato durante le mestruazioni**: è consigliato eseguirlo dal 10° al 22° giorno del ciclo (contando dal primo giorno delle mestruazioni) e in ogni caso **non devono esserci perdite ematiche in atto**.

Se dovessero sopraggiungere deve essere rimandato.

Si dovrebbero inoltre **evitare i rapporti sessuali nelle 48 ore precedenti alla raccolta del campione**.

È sconsigliato l'uso di lavande vaginali o l'inserimento di ovuli, prodotti spermicidi, creme, gel o schiume di qualunque tipo in vagina nelle 72 ore precedenti all'esame.

L'uso di contraccettivi orali o locali o la presenza della spirale intrauterina, invece, non interferiscono con il risultato del test.

L'esame può essere eseguito anche in gravidanza

Il referto disponibile entro 25 gg (lavorativi)